Study	Year	Country	Sample size (n)	NAFLD Patients (n)	Lymphoma/Leukemia Cases (n)	Hazard Ratio with 95% CI	Weight (%)
NAFLD by Ultrasonography							
Kim GA (NH Lymphoma)	2017	South Korea	25947	8721	49	0.94 [0.52, 1.70]	40.46
Kim GA (Leukemia)	2017	South Korea	25947	8721	16	1.16 [0.42, 3.20]	27.34
Heterogeneity: τ^2 = 0.00, I^2 = 0.00%, H^2 = 1.00						0.99 [0.59, 1.65]	
Test of $\theta_i = \theta_j$: Q(1) = 0.12, p = 0.73							
NAFLD by ICD-9/10 codes							
Sun	2015	Taiwan	10545	2109	33	3.12 [1.34, 7.26]	32.20
Heterogeneity: τ^2 = 0.00, I^2 = .%, H^2 = .						3.12 [1.34, 7.26]	
Test of $\theta_i = \theta_j$: Q(0) = 0.00, p = .							
Overall						1.47 [0.69, 3.12]	
Heterogeneity: τ^2 = 0.28, I^2 = 62.29%, H^2 = 2.65							
Test of $\theta_i = \theta_j$: Q(2) = 5.30, p = 0.07							
Test of group differences: $Q_b(1)$ = 5.18, p = 0.02							
Total			36492	10830	98		



Random-effects DerSimonian-Laird model